

**GITNA NG AGOS IHI (MIDSTREAM URINE)**

1. Makamit ang isang lalagyan mula sa iyong doktor o pinakamalapit na Wellington SCL Patolohiya kuwarto.
2. Specimens nakolekta sa unang bahagi ng umaga ay ginustong ngunit hindi mahalaga.
3. Uncircumcised lalaki: bawiin ang foreskin.
4. Kababaihan: punasan ang perineal area mula sa harap i-back na may toilet papel o wash na may mainit-init na tubig at mga bahagi ng labia upang maiwasan ang vulval contamination.
5. Payagan ang ilang ihi upang pumasa sa toilet pagkatapos ay pumasa sa ilang direkta sa malinis na lalagyan hanggang sa ito ay ganap na kalahati; pagkatapos ay pumasa ang natitirang bahagi ng ihi sa toilet.
6. Ligtas na pag-ugnayin ang mga talukap ng mata at ang label na may buong pangalan, petsa ng kapanganakan, oras at petsa ng koleksyon.
7. Ilagay sa plastik na bag ispesimen sa kahilingan na form mula sa iyong doktor.
8. Dumaan sa ispesimen sa iyong doktor o pinakamalapit na Wellington SCL mga kuwarto.
9. May perpektong, ihi specimens ay dapat na agad palamigan at inihatid sa laboratoryo sa loob ng apat na oras.

Mangyaring makipag-ugnay sa main laboratoryo para sa karagdagang impormasyon sa (04) 381 5900

For all enquires please contact WELLINGTON SCL on 04 381 5900

Patient information - Instructions for collecting Midstream Urine—Filipino

Version: 1.0
Updated November 2016

Amended Version: Nil
Amended On: Nil

© COPYRIGHT 2015 WELLINGTON SCL

Author: Customer Liaison
Next Review Date: November 2017